

Inhoudsopgave

<i>Doel.....</i>	<i>2</i>
<i>Toepassingsgebied</i>	<i>2</i>
<i>Bevoegdheden en verantwoordelijkheden</i>	<i>2</i>
<i>Werkwijze</i>	<i>2</i>
<i>Bronnen.....</i>	<i>3</i>
<i>Bijlage 1 Tabel 1 Indicaties werkverbod bij infectieuze aandoeningen.....</i>	<i>3</i>

Doel

Preventie van overdracht van micro-organismen/ infecties vanuit medewerkers naar andere medewerkers en/of cliënten.

Toepassingsgebied

Indien een medewerker een infectieuze aandoening heeft, is het van belang dat de juiste maatregelen genomen worden om verspreiding van micro-organismen te voorkomen. Deze procedure geldt dan ook voor iedereen die werkzaam is binnen Beek & Bos. Om overdracht van micro-organismen en infecties te voorkomen moet de overdrachtsweg belemmerd worden. Dit kan op verschillende manieren, zoals een algeheel werkverbod of het goed afdekken van een lokale infectie. Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende infectieuze aandoeningen en de te nemen maatregelen hierbij. In een aantal gevallen wordt er onderscheid gemaakt in de te nemen maatregelen tussen verschillende groepen medewerkers.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- Iedere medewerker is op de hoogte van de geldende procedure t.a.v.(mogelijke) infecties bij medewerkers
- Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor een juiste invulling van hun rol in deze procedure, inclusief eventuele ziek- en herstelmelding.
- De medewerker met een infectieuze aandoening stelt zijn/haar leidinggevende op de hoogte van de infectie.
- De leidinggevende, stelt een eventueel werkverbod in bij medewerkers met een infectieuze aandoening en/of geeft advies over de maatregelen die genomen moeten worden.
- Bij twijfel wordt de deskundige infectiepreventie of bedrijfsarts geraadpleegd.

Werkwijze

- Een medewerker met mogelijk één van genoemde aandoeningen in tabel 1, meldt zich vóór deze aan het werk gaat bij de leidinggevende volgens de geldende procedure bij ziekte/herstel.
- De leidinggevende bespreekt de melding met een MT-lid. Deze neemt indien nodig contact op met de bedrijfsarts. Als de bedrijfsarts afwezig is, zal het overleg plaatsvinden met de deskundige infectiepreventie.
- Indien nodig wordt de medewerker verzocht naar de huisarts te gaan en een kweek af te laten nemen. In sommige gevallen kan er binnen Beek & Bos een kweek/test worden afgenomen, bv bij MRSA.
- Indien een werkverbod ingesteld wordt, meldt de medewerker zich officieel ziek volgens de normaal geldende procedure.
- Indien behandeling noodzakelijk blijkt, wordt betrokkene, al dan niet met een kweekuitslag, verwezen naar de huisarts.

- Het werkverbod wordt door de leidinggevende aan de hand van tabel 1 opgeheven. Indien men hiervan af wil wijken, dient dit altijd overlegd te worden met de deskundige infectiepreventie of de bedrijfsarts
- Zodra de medewerker hersteld is, meldt deze zich 'beter' volgens de geldende procedure bij ziekte/herstel.

Bronnen

[SRI-richtlijnen](#): Handhygiëne en persoonlijke hygiëne medewerker, 09-02-2024.

Bijlage 1 Tabel 1 Indicaties werkverbod bij infectieuze aandoeningen

Aandoening	Medewerker	Werkverbod?
Conjunctivitis (bacterieel) Zie oogontsteking (bacterieel)	Met cliëntencontact	Ja, tot 48uur na start therapie of totdat het tranen is gestopt. Medewerker mag geen cliëntgebonden handelingen verrichten
	Zonder cliëntencontact	Nee, mits goede handhygiëne na contact met oog/traanvocht
	Werkzaam in de voedingssector	Nee, mits goede handhygiëne na contact met oog/traanvocht
Conjunctivitis (viraal) Zie oogontsteking (viraal)	Met cliëntencontact	Ja, tot het tranen is gestopt. Medewerker mag geen cliëntgebonden handelingen verrichten
	Zonder cliëntencontact	Nee, mits goede handhygiëne na contact met oog/traanvocht
	Werkzaam in de voedingssector	Nee, mits goede handhygiëne na contact met oog/traanvocht
Covid-19, Coronavirus	met/ zonder cliëntencontact of werkzaam in de voedingssector	Zie coronadraaiboek

Diarree Indien diagnose onbekend: 1. (water)dunne ontlasting 2. herstelfase Indien diagnose bekend: 3. Salmonella / Campylobacter 4. Salmonella typhi 5. Salmonella paratyphi 6. Overige Salmonellosen 7. Vibrio cholerae / Shigella	met/ zonder cliëntencontact of werkzaam in de voedingssector	1. Ja, tot klinisch herstel 2. Nee, mits goede hygiëne 3. Ja, tot klinisch herstel 4. Ja, tot fecesweek 3 maal negatief is met intervallen van 1 dag, eerste kweek afnemen 3 weken na laatste koortsdag en tenminste 2 weken na beëindigen van evt. antibioticakuur 5. Ja, indien werkzaam in voedingssector of werken met ernstig immuun gecompromitteerde cliënten, dan werkverbod handhaven tot fecesweek 3 maal negatief is met intervallen van 1 dag, eerste kweek afnemen 3 weken na laatste koortsdag en tenminste 2 weken na beëindigen van evt. antibioticakuur. 6. Ja, tot klinisch herstel 7. Ja, tot twee fecesweken negatief zijn bevonden met interval van 3 dagen
Furunculose Zie steenpuist		
Gordelroos synoniem: Herpes Zoster	Medewerker is infectieus van 2 dagen vóór tot maximaal 7 dagen na het verschijnen van de blaasjes, of tot deze ingedroogd zijn.	
	met cliëntencontact	• Nee, bij beperkte laesies én mits aangedane gebied afgedekt blijft tot laesies ingedroogd zijn • Ja, bij uitgebreide laesies • Ja, indien werkzaam bij patiënten met verminderde afweer zoals AIDS, M. Hodgkin, leukemie en immunosuppressieve therapie en leucopenie. Werkverbod geldt tot alle herpesblaasjes zijn ingedroogd.
	zonder cliëntencontact	Nee, mits aangedane gebied afgedekt is
	werkzaam in voedingssector	Nee, mits aangedane gebied afgedekt is
Hepatitis A	met/ zonder cliëntencontact of werkzaam in de voedingssector	Ja, tot tenminste 7 dagen na het begin van de icterus
Hepatitis B acuut of drager	met cliëntencontact	Als bij medewerker uit risicogroep 1 (risicovormers) dragerschap wordt vastgesteld, wordt vervolgonderzoek

		uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mate van besmettelijkheid. Het is zinloos om al besmette personen verder te booster. Een risicoanalyse naar de kans op transmissie naar patiënten zal moeten plaatsvinden. Risicohandelingen vermijden tot uitslag risicoanalyse bekend is.
	zonder cliëntencontact	Nee
	werkzaam in de voedingssector	Nee
Herpes Simplex Zie koortslip		
Herpes Zoster Zie gordelroos		
Kinkhoest	met/ zonder cliëntencontact of werkzaam in de voedingssector	Nee, indien werkzaam met immuun gecompromitteerde cliënten, werkverbod gedurende 4 weken, tenzij de medewerker een effectieve antibioticakuur heeft gekregen, dan geldt een werkverbod gedurende 7 dagen
Koortslip synoniem: Herpes Simplex 1. handen 2. koortslip 3. genitaal	met cliëntencontact	1. Ja, of direct cliëntencontact vermijden 2. Ja, tot de blaasjes volledig zijn ingedroogd of nee, indien er consequent een mondmasker wordt gedragen en goede handhygiëne wordt toegepast. Contact met immuun gecompromitteerden is niet toegestaan 3. Nee, mits goede handhygiëne in acht wordt genomen
	zonder cliëntencontact	1. Afhankelijk van de werkomstandigheden (overleg deskundige infectiepreventie) 3. Nee 3. Nee, mits goede handhygiëne in acht wordt genomen

	werkzaam in voedingssector	1. In overleg met deskundige infectiepreventie 2. Nee, mits de laesie afgedekt kan worden en er consequent goede handhygiëne wordt toegepast 3. Nee, mits goede handhygiëne in acht genomen wordt
Krentenbaard	met/ zonder cliëntencontact of werkzaam in de voedingssector	Ja, tot tenminste 48 uur na beginsymptomen én wondjes of laesies moeten dicht zijn. Indien geen tekenen van genezing, dan wordt werkverbod gecontinueerd.
MRSA	met/ zonder cliëntencontact of werkzaam in de voedingssector	Conform MRSA-protocol, overleg met deskundige infectiepreventie
Nagelriemontsteking Synoniem: Panaritium	met cliëntencontact	Ja, indien goed afdekken (met ademend wond-verband) niet mogelijk Ja, indien werkzaam bij: • immuun gecompromitteerde cliënten • bij cliënten met wonden, blaaskatheter en intravasale katheters. Nee, indien goed afdekken (met ademend wond-verband) mogelijk is. Verband mag de handhygiëne niet belemmeren.
	zonder cliëntencontact	Altijd in overleg met deskundige infectiepreventie
	werkzaam in voedingssector	Nee
Norovirus	met/ zonder cliëntencontact of werkzaam in de voedingssector	Ja, tot klinisch herstel (geen koorts, geen braken, geen diarree) en gedurende 5 dagen gebruik van een eigen toilet op de werkvloer
Oogontsteking (bacterieel)= Conjunctivitis (bacterieel) Is in het algemeen enkelzijdig	met cliëntencontact	Ja, tot 48 uur na start therapie of totdat het tranen is gestopt. Medewerker mag geen cliëntgebonden handelingen verrichten
	zonder cliëntencontact	Nee, mits goede handhygiëne na contact met oog/traanvocht
	werkzaam in voedingssector	Nee, mits goede handhygiëne na contact met oog/traanvocht

Oogontsteking (viraal) = Conjunctivitis (viraal) Tranen lopen over de wangen, veel jeuk	met cliëntencontact	Ja, tot het tranen is gestopt. Medewerker mag geen cliëntgebonden handelingen verrichten
	zonder cliëntencontact	Nee, mits goede handhygiëne na contact met oog/traanvocht
	werkzaam in voedingssector	Nee, mits goede handhygiëne na contact met oog/traanvocht
Panaritium Zie nagelriemontsteking		
Roodvonk	zie streptokokkeninfectie	Zie streptokokkeninfectie
Scabiës Zie schurft		
Schimmelinfecties huid, haar en nagels - dermatofytose - onychomycose	met cliëntencontact	Nee, tenzij infectie zich op onbedekte huid bevindt bij werkzaamheden bij cliënten met: • haemodialyse • immunosuppressieve therapie • Aidspatiënten • patiënten met recente OK-wonden
	zonder cliëntencontact	Nee
	werkzaam in voedingssector	Ja, bij schimmelinfectie aan de handen en nagels wordt in overleg met deskundige infectiepreventie een werkverbod ingesteld
Schurft Synoniem: Scabiës	met cliëntencontact	Ja, direct cliëntcontact vermijden tot tenminste 24 uur na effectieve therapie. Voor uitbraakbeleid zie draaiboek Scabiës LCI
	zonder cliëntencontact	Nee
	werkzaam in voedingssector	Nee
Steenpuist Synoniem: furunculose	met cliëntencontact	Variabel; afhankelijk van werkomstandigheden en mogelijkheid tot goed afdekken (met een chirurgische pleister). In elk geval werkverbod tot klinisch herstel bij contact met: • immuun gecompromitteerde cliënten • cliënten met wonden, blaaskatheter en intravasale katheters

	zonder cliëntencontact	Nee, mits laesie goed kan worden afgedekt
	werkzaam in voedingssector	Nee, mits laesie goed kan worden afgedekt
Staphylococcus aureus in aangezicht of oor	met/ zonder cliëntencontact of werkzaam in de voedingssector	Ja, bij kweek met S. aureus werkverbod instellen tot klinisch herstel
Streptokokkeninfectie (=groep A Streptokokken) 1. erysipelas (wondroos, belroos) 2. roodvonk, impetigo, keelontsteking	met cliëntencontact	1. Ja, afhankelijk van de aard van de infectie tot tenminste 5 dagen na start therapie én geen open wonden aanwezig 2. Ja, tot tenminste 5 dagen na start therapie en bij symptomen aan de handen tot de blaasjes zijn ingedroogd
	zonder cliëntencontact	1. Nee 2. Nee
	werkzaam in voedingssector	1. Nee 2. Nee
Varicella zoster Zie waterpokken		
Waterpokken Synoniem: Varicella zoster	met/ zonder cliëntencontact of werkzaam in de voedingssector	Ja, totdat de blaasjes zijn ingedroogd.
Wonden geïnfecteerd/pussend	met cliëntencontact	Ja, tot kweekresultaten bekend zijn. Werkverbod continueren bij groep A streptokokken, S. aureus of Pseudomonas species. Indien veroorzaakt door ander micro-organismen geen werkverbod mits goed afdekken (met een chirurgische pleister) mogelijk is.
	zonder cliëntencontact	In overleg met deskundige infectiepreventie
	werkzaam in voedingssector	Ja, tot kweekresultaten bekend zijn. Werk hervatten i.o.m. deskundige infectiepreventie