

Stap 2

• De leidinggevende van de afdeling / groep stelt (samen met de zorgmedewerker) vast of de cliënt isoleerbaar is. Hiervoor wordt uitgegaan van de bijgevoegde definitie van "isoleerbaar"

Een cliënt is isoleerbaar wanneer:

- deze uitsluitend op de eigen kamer verblijft gedurende de besmettelijke periode (besmettelijke periode is tot 48 uur na klinisch herstel; klinisch herstel betekent geen braken en een voor de cliënt normaal defecatiepatroon)
- deze uitsluitend het eigen toilet en douche gebruikt
- geen direct (lichamelijk) contact heeft met andere cliënten. Andere cliënten komen dus niet op de kamer van de isolatiecliënt

• De leidinggevende van de afdeling noteert "isoleerbaar" of "niet isoleerbaar" in het registratie-formulier

• De leidinggevende van de afdeling stelt het aantal isoleerbare en niet-isoleerbare cliënten van de afdeling / groep vast

Registratieformulier voor cliënten en medewerkers met maagdarminfectie

• De leidinggevende van de afdeling / groep stelt vast hoeveel medewerkers symptomen van een maagdarminfectie hebben en een risico-contact hebben gehad. (Risico-contact is korter dan 24 uur vóór ontstaan van symptomen, onvoldoende beschermd contact met ontlasting en/of braaksel van een nu ziek-zijnde cliënt.)

• De leidinggevende van de afdeling / groep legt dit vast in het registratieformulier

• De leidinggevende van de afdeling / groep vult de bijgevoegde formule in en bepaalt of de uitkomst groter of kleiner is dan 1/3

$$\frac{\text{aantal cliënten die ziek zijn (geweest) + aantal medewerkers die ziek zijn (geweest)}}{\text{totaal aantal cliënten van de afdeling / groep}} = < 1/3$$

Ga door naar stap 3